Modélisation mathématique des dynamiques collectives cellulaires

Laurent NAVORET

Institut de Recherche Mathématique Avancée, Université de Strasbourg
Vendredi 6 Octobre 2020

Nage

Reptation

Comment les cellules se déplacent-elles et comment interagissent-elles ?

(b)

Nage

10 μm

Mouvement d'un spermatozoïde

Auto-propulsion

- Déplacement à l'aide du flagelle
- Théorème de la coquille saint-jacques : dans un fluide visqueux et pour un mouvement à faible vitesse, les mouvements réversibles en temps ne conduisent pas à un déplacement

[Chambrion, Munnier]

Mouvement collectif

→ spermatozoïdes dans un liquide séminal

- $5 \cdot 10^9$ cellules par cm^3
- volume ratio 50%

→ mouvement collectif

- motilité
- ondes noires
- mesure de la fertilité

[X. Druart]

⇒ Modélisation très simplifiée des interactions entre cellules

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position}, \text{vitesse})$

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position, vitesse})$

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position}, \text{vitesse})$

$$X'_1 = V_1$$

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position}, \text{vitesse})$

$$X'_1 = V_1$$

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position}, \text{vitesse})$

$$X_1' = V_1$$

$$V_1' = F_1(X_1, V_1, X_2, V_2, X_3, V_3, \dots)$$

→ $F_1 =$ **alignement sur la vitesse moyenne des voisins**

$$\bar{V}_1 = \frac{1}{4}(V_2 + V_3 + V_4 + V_5)$$

Modélisation

Cellule assimilée à des particules ponctuelles (sans volume)

Modélisation :
 $(X_k(t), V_k(t)) = (\text{position}, \text{vitesse})$

$$X_1' = V_1$$

$$V_1' = F_1(X_1, V_1, X_2, V_2, X_3, V_3, \dots)$$

→ $F_1 =$ **alignement sur la vitesse moyenne des voisins**

$$\bar{V}_1 = \frac{1}{4}(V_2 + V_3 + V_4 + V_5)$$

→ vitesse à peu près constante :

$$|V_1| = 1$$

Exemples de mouvements collectifs

Modèle d'**alignement** (modèle de Vicsek)

$$X'_k = V_k$$

$$V'_k = P_{V_k^\perp} \left[\overset{\text{alignement}}{\nu(\bar{V}_k - V_k)} + \sqrt{2D} \times \text{alea} \right]$$

$$|V_k| = 1.$$

Paramètres

- ν - réactivité pour s'aligner sur la vitesse moyenne des voisines $\bar{V}_k$
- D - amplitude des défauts de perception

Exemples de mouvements collectifs

Modèle d'**alignement** (modèle de Vicsek)

alignement
local

alignement
global

Mouvement macroscopique

→ N particules : N^2 interactions

→ nombres de particules grands : difficulté numérique

⇒ décrire le mouvement dans son ensemble

Mouvement macroscopique

→ N particules : N^2 interactions

→ nombres de particules grands : difficulté numérique

⇒ décrire le mouvement dans son ensemble

→ déterminer la dynamique de la densité moyenne n et de la vitesse moyenne u

$$n(x, t) = \frac{\text{nb de particules dans } B_x}{\text{volume de } B_x}$$

$$u(x, t) = \text{moyenne des vitesses des particules dans } B_x$$

Modèle macroscopique

Hypothèses :

- très grand nombre de particules
- observation à large échelle

Outils :

- physique statistique

modèle particulaire

$$(X_k(t), V_k(t))$$

modèle macroscopique

$$(n(x, t), u(x, t))$$

N équations différentielles couplées $\Rightarrow$ 2 équations aux dérivées partielles

Modèles macroscopiques

Modèle d'**alignement**

Modèle micro

$$X'_k = V_k$$

$$V'_k = F_k$$

$$|V_k| = 1$$

Modèle macro

$$\partial_t n + \nabla_x \cdot (c_1 n u) = 0 \quad (\text{densité})$$

$$\partial_t u + c_2 u \cdot \nabla_x u = -\frac{D}{\nu} P_{u^\perp} \left[\frac{\nabla_x n}{n} \right] \quad (\text{direction moyenne})$$

alignement

$$|u| = 1$$

auto-propulsion

Expérience

[Creppy et al.]

[Creppy et al.]

⇒ Rotation : Brisure de symétrie

Comparaisons expériences / modèles

$\tilde{V}_\theta$: vitesse de rotation dans l'anneau
en fonction de
 ϕ : densité moyenne dans l'anneau

[Creppy et al.]

→ **prédiction théorique d'une transition de phase :**
(faible densité) pas de mouvement
(grande densité) mouvement

04:48

Reptation

Auto-propulsion

→ Développement de protrusions

[Caballero et al, 2014]

→ réorganisation du cyto-squelette

→ polarisation des cellules

Mouvement collectif

→ Embryogenèse :

→ **Expérience in vitro**

[Lo Vecchio et al.]

Mouvement collectif

→ Embryogenèse :

→ **Expérience in vitro**

[Lo Vecchio et al.]

- ⇒ **Rotation** : brisure de symétrie pour les petits diamètres
- ⇒ **modélisation des interactions** : alignement des polarités

N cellules sphériques de rayon $R > 0$.

$(X_k(t), V_k(t), P_k(t))$: position, vitesse, polarité

Modèle micro

$$\frac{d}{dt}X_k = V_k$$

$$V_k = \mathbf{P}_{C_X} P_k$$

$$dP_k(t) = \mathbf{P}_{P_k^\perp} \circ \left(\mu (\bar{P}_k - P_k) + \sqrt{2D} \text{alea} \right)$$

Alignement des polarité (Vicsek model)

Congestion

C_X : ensemble des vitesses admissibles afin d'éviter le chevauchement

$\mathbf{P}_{C_X}$: projection sur l'ensemble des vitesses admissibles

→ interactions à longue distance des cellules

Observation

Time $t = 0.00$

Confinement actif

[Lo Vecchio]

Confinement actif

[Lo Vecchio]

⇒ **Cable d'actine sur le bord de l'agrégat**

- structure interne aux cellules mais continue d'une cellule à l'autre
  - élasticité du câble
- + réaction active des cellules à ce câble

N cellules sphériques de rayon $R > 0$.

$(X_k(t), V_k(t), P_k(t))$: position, vitesse, polarité

Modèle micro

$$\frac{d}{dt} X_k = V_k$$

$$V_k = \mathbf{P} c_X P_k$$

$$dP_k(t) = \mathbf{P}_{P_k^\perp} \circ \left(\mu (\bar{P}_k - P_k) dt + F_{cable} dt + \sqrt{2D} alea \right)$$

Force active du câble

→ alignement de la polarité des cellules dans la direction du câble I

Observation

Time $t = 0.00$

Observation

Time $t = 0.00$

→ Rotation

Conclusion

Conclusion

- Chercher les **hypothèses minimales** pour obtenir des mouvements collectifs.
- Modèles macroscopiques : avantages théoriques et numériques.
- Aller-retour expériences / modélisation
- intense activité de recherche en physique théorique / mathématique
[cours de J.F. Joanny, College de France]

Conclusion

- Chercher les **hypothèses minimales** pour obtenir des mouvements collectifs.
- Modèles macroscopiques : avantages théoriques et numériques.
- Aller-retour expériences / modélisation
- intense activité de recherche en physique théorique / mathématique
[cours de J.F. Joanny, Collège de France]

$$2\gamma v_{\alpha\beta} = \left(1 + \frac{D}{Dt}\right) \left\{ \sigma_{\alpha\beta} + \zeta \Delta \mu \rho_{\alpha\beta} + \pi A_{\alpha\beta} - \frac{\eta_1}{2} \left(\rho_\alpha h_\beta + \rho_\beta h_\alpha - \frac{2}{3} h_\gamma \rho_\gamma \delta_{\alpha\beta} \right) \right\}$$

$$\frac{D}{Dt} \rho_\alpha = -\frac{1}{\gamma_1} h_\alpha + \lambda_1 \rho_\alpha \Delta \mu - v_\gamma v_{\alpha\beta} \rho_\beta - \dot{\gamma}_1 v_{\beta\gamma} \rho_\alpha, \quad \dot{\epsilon} = \Lambda \Delta \mu + \zeta \partial_\alpha \rho_\alpha v_{\alpha\beta} + \dot{\zeta} v_{\alpha\alpha} + \lambda_1 \rho_\alpha h_\alpha$$

STRASBOURG UNIVERSITY · FRANCE