

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Considérons l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et notons $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ le sous-ensemble des éléments inversibles pour la loi de la multiplication sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

- Trouver deux entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $15u + 26v = 1$.
- Soit $m \in \mathbb{Z}$ un autre entier. Montrer que $\gcd(m, n) = 1$ si et seulement s'il existe deux entiers $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $um + vn = 1$.
- Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$ est un groupe.

Exercice 2. Le but de cet exercice est de montrer le théorème des restes chinois suivant : Soient m, n deux entiers, et $\phi : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ le morphisme de réduction défini par $\phi : x + mn\mathbb{Z} \mapsto (x + m\mathbb{Z}, x + n\mathbb{Z})$. Si $(m, n) = 1$, alors ϕ est un isomorphisme d'anneaux.

- Montrer que ϕ est un homomorphisme d'anneaux.
- Supposons que $(m, n) = 1$. Montrer que ϕ est injectif, et en déduire que ϕ est un isomorphisme d'anneaux, et qu'il induit donc un isomorphisme de groupes $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- Soient $u, v \in \mathbb{Z}$ satisfaisant $um + vn = 1$ et soient $a, b \in \mathbb{Z}$ des entiers arbitraires. Calculer l'image de $aum + bvn$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Trouver un entier x qui vérifie les conditions suivantes :

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$

Exercice 3. Dans cet exercice, on donne des applications du théorème des restes chinois.

- Soit G un groupe abélien de type fini. Montrer qu'il existe une unique suite des entiers positifs d_1, d_2, \dots telle que d_i divise d_{i+1} pour tout i et

$$G = \prod_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}.$$

- Soit $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ avec la factorisation primaire $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, où $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ et p_i sont des nombres premiers avec $p_i \neq p_j$ si $i \neq j$. Montrer qu'on a un isomorphisme d'anneaux

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \prod_i \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$$

- Calculer l'ordre du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- Montrer que tout groupe abélien d'ordre 24 est isomorphe à l'un des trois groupes suivants :

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

Pourquoi ces trois groupes ne sont-ils pas isomorphes ? Trouver les nombres d_i correspondants.

- Combien y-a-t-il de classes d'isomorphisme des groupes abéliens d'ordre 10^4 ?

Exercice 4. Soient $p \geq 3$ un nombre premier, et $e \geq 1$ un entier. Le but de cet exercice est de montrer que le groupe $G = (\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $(p-1)p^{e-1}$.

- Soit $a \equiv b \pmod{p^e}$. Montrer que $a^p \equiv b^p \pmod{p^{e+1}}$.
- Montrer que $(1 + ap)^{p^{e-2}} \equiv 1 + ap^{e-1} \pmod{p^e}$.
- On fixe un $a \in \mathbb{Z}$ tel que $p \nmid a$. Trouver l'ordre de $1 + ap$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times$.
- On notera par $H \in G$ le sous-groupe cyclique engendré par $1 + ap$. Montrer qu'on a un isomorphisme de groupes $G/H \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$.
- Soit $x \in G$ tel que son image dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ soit un générateur. Montrer que $x(1 + ap)$ est un générateur de G .

Exercice 5* Soit $e \geq 2$ un entier. On pose $H = \{x \in (\mathbb{Z}/2^e\mathbb{Z})^\times \mid x \equiv 1 \pmod{4}\}$.

- Montrer que $5^{2^{e-3}} \equiv 1 + 2^{e-1} \pmod{[2^e]}$.
- Montrer que H est un groupe cyclique d'ordre 2^{e-2} et $5 \in H$ est un générateur de H .
- Montrer que on a $(\mathbb{Z}/2^e\mathbb{Z})^\times = H \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice 6* Soit G un groupe fini. Une *représentation* de G est un homomorphisme $\rho : G \rightarrow \text{Aut}(V)$, où V un espace vectoriel sur \mathbb{C} de dimension finie.

On dit qu'un sous-espace $W \subset V$ est invariant si il est invariant par rapport à tout les applications $\rho(g)$ où $g \in G$.

- Montrer que pour tout espace invariant W il existe un sous-espace invariant supplémentaire W' .
- Montrer que si G est abélien il existe un sous-espace de V invariant de dimension 1.
- Montrer que tout représentation de G est isomorphe à une somme de représentations de dimension 1.

Exercice 7. Expliciter tous les caractères pour les groupes

- $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$
- $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$.
- Expliciter tous les caractères d'ordre 2 pour le groupe $(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$.

Exercice 8. Soient G un groupe abélien fini et \hat{G} son groupe de caractères. Notons \mathbb{C}^G l'espace des fonctions complexes sur G . Pour $f \in \mathbb{C}^G$, on définit sa transformée de Fourier $\hat{f} \in \mathbb{C}^{\hat{G}}$ par

$$\hat{f}(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} \overline{\chi(x)} f(x).$$

- Montrer que pour toute $f \in \mathbb{C}^G$, on a

$$f(x) = \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}(\chi) \chi(x).$$

- Montrer qu'on a une égalité

$$\sum_{x \in G} |f(x)|^2 = |G| \sum_{\chi \in \hat{G}} |\hat{f}(\chi)|^2$$

- Soit $H \in G$ un sous-groupe de G et $H^\perp \subset \hat{G}$ est défini comme $\{\chi \in \hat{G} \mid \chi(x) = 1 \text{ pour tout } x \in H\}$. Montrer que pour tout $f \in \mathbb{C}^G$

$$\sum_{x \in H} f(x) = |H| \sum_{\chi \in H^\perp} \hat{f}(\chi)$$

.

- d. Montrer que $\widehat{fg} = \widehat{f} * \widehat{g}$ et $\widehat{f * g} = |G| \widehat{f} \widehat{g}$. Ici $f * g(x) = \sum_{y,z|y+z=x} f(y)g(z)$ et la convolution des fonctions f et g .

Exercice 9.

- a. Montrer que

$$\left(\frac{a}{p} \right) = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

- b. Caractériser les nombres premiers p modulo lesquels -1 est un carré.
c. Caractériser les nombres premiers p modulo lesquels 2 est un carré.

Exercice 10. Exprimer la condition que a premier avec p est un carré modulo p^k , en termes de symbole de Legendre.

Exercice 11. *Sommes de Gauss.* Soit p un nombre premier. On pose ζ une racine primitive p -ème de l'unité, par exemple $\zeta = \exp(2\pi i/p)$. Soit $\chi : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ un caractère. On étend χ en une fonction sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ en posant $\chi(0) = 0$. Pour $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ on pose

$$\tau_a(\chi) = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \chi(x) \zeta^{ax}$$

et $\tau(\chi) = \tau_1(\chi)$. On appelle les $\tau_a(\chi)$ des *sommes de Gauss* de χ .

- a. Montrer que $\tau_a(\chi) = \bar{\chi}(a)\tau(\chi)$ pour tout $(a, \chi) \neq (0, \varepsilon)$ où ε est le caractère trivial.
b. Calculer $\tau(\chi_1)\tau(\chi_2)/\tau(\chi_1\chi_2)$ pour tout (χ_1, χ_2) tels que $\chi_1\chi_2 \neq \varepsilon$.
c. Calculer $\tau(\chi)\tau(\bar{\chi})$ pour tout $\chi \neq \varepsilon$.
d. Calculer $|\tau(\chi)|$ pour tout $\chi \neq \varepsilon$.
e. Montrer que si $\chi(x) = \left(\frac{x}{p} \right)$ est le symbole de Legendre, alors on a $\tau(\chi)^2 = (-1)^{(p-1)/2}p$ et en déduire que

$$\tau(\chi) = \pm \begin{cases} \sqrt{p} & \text{si } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ i\sqrt{p} & \text{si } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

- f. Soit q un nombre premier différent de p . Calculer $\tau(\chi)^q \pmod{q}$ avec la formule de binôme. En déduire la loi de réciprocité :

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} \frac{q-1}{2} \left(\frac{p}{q} \right) \left(\frac{q}{p} \right) = 1$$

- g. Calculer $\left(\frac{79}{101} \right)$ et $\left(\frac{1877}{3323} \right)$.

Exercice 12. (*Somme de Gauss quartique*). Soit p un nombre premier avec $p \equiv 1 \pmod{4}$, et soit $\chi : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ un caractère d'ordre 4. On pose

$$J = \sum_{t=1}^{p-2} \left(\frac{1+t}{p} \right) \chi(t).$$

- a. Montrer que

$$\tau(\chi)^2 = J\tau(\chi^2)$$

.

- b. Montrer que J prend valeurs dans les nombres Gaussien $\mathbb{Z}[i]$ et que $J\bar{J} = p$. En déduire que tout nombre premier p avec $p \equiv 1 \pmod{4}$ est une somme de deux carrées.
- c. Montrer que tout nombre premier p avec $p \equiv 3 \pmod{4}$ n'est pas une somme de deux carrés.

Exercice 13.

- a. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, la série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^k}{n^s}$$

converge pour tout $s \in \mathbb{R}_{>1}$.

- b. Montrer que pour tout $x > 0$ on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2} < \frac{\pi}{2x}$$

- c. Montrer que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + m^4} < \frac{\pi^3}{12}$$

Exercice 14. (Séries d'Eisenstein). Soient $\tau \in \mathbb{C}$ avec $\Im \tau > 0$, et $s \in \mathbb{R}_{>0}$.

- a. Montrer que la série d'Eisenstein

$$E(s, \tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{|m+n\tau|^{2s}}$$

converge absolument lorsque $s > 1$.

- b. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$ la série d'Eisenstein

$$E_{2k}(\tau) = \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau)^{2k}}$$

définit bien une fonction holomorphe sur le demi-plan supérieur $\tau \in \mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} | \Im z > 0\}$

- c. Soit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ une matrice aux éléments entiers et déterminant 1. Calculer $E\left(s, \frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right)$ et $E_{2k}\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right)$.

Exercice 15* Considérons la fonction

$$f(z) = \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-n)^2}$$

- a. Montrer que f est holomorphe sur \mathbb{C} .

- b. Montrer que f est bornée.

- c. Calculer $\lim_{\Im z \rightarrow \infty} f(z)$.

- d. En déduire que $f = 0$.

- e. Montrer que

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right).$$

f. Montrer que

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

Exercice 16* (*Fonction \wp de Weierstrass*). Considérons la fonction

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(z+m+n\tau)^2} - \frac{1}{(m+n\tau)^2}$$

- a. Montrer que la série est convergente et que \wp est une fonction holomorphe en dehors de l'ensemble $\{m+n\tau | m, n \in \mathbb{Z}\}$.
- b. Calculer $\wp(z+m+n\tau)$.

Exercice 17. Soit C l'ensemble des fonctions complexes définies sur \mathbb{N}^* . Pour $f, g \in C$ on pose

$$f * g(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = \sum_{d_1, d_2 | d_1 d_2 = n} f(d_1)g(d_2)$$

convolution multiplicative de f et g .

- a. Montrer que la convolution est commutative et associative.
- b. Trouver une fonction $\varepsilon \in C$ telle que $f * \varepsilon = f$.
- c. Décrire toutes fonctions $f \in C$ inversibles par rapport à la convolution.
- d. Montrer que l'espace de fonctions multiplicatives est stable par rapport à la convolution.
- e. Soit $\mu \in C$ la fonction telle que $\mu(n) = (-1)^r$ si $n = p_1 \cdots p_r$ est un produit de r nombres premiers distincts, et $\mu(n) = 0$ sinon. On appelle μ la fonction de Möbius. Calculer $\mu * 1$. En déduire l'inverse de la fonction μ par rapport à la convolution.
- f. Soit $\varphi \in C$ la fonction définie par $\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. On appelle φ l'indicatrice d'Euler. Calculer $\sum_{d|n} \varphi(d)$.
- g. Let $g \in C$. Trouver la fonction $f \in C$ telle que $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$.

Exercice 18. On dit que $f \in C$ est à *croissance polynomiale*, s'il existe un entier k tel que $f(n) = O(n^k)$ lorsque $n \rightarrow \infty$. On notera par $C' \subset C$ l'espace de fonctions de croissance polynomiale.

Pour $f \in C'$ on pose

$$L(s, f) = \sum_n \frac{f(n)}{n^s}.$$

- a. Montrer que C' est fermé par rapport à la convolution.
- b. Montrer que $L(s, f)$ est une fonction holomorphe pour $\Re(s)$ assez grand.
- c. Exprimer $L(s, f * g)$ en termes de $L(s, f)$ et $L(s, g)$.
- d. Calculer $L(s, \mu)$ et $L(s, \varphi)$ en termes de $\zeta(s) = L(s, 1)$, où φ est l'indicatrice d'Euler et μ - la fonction de Möbius.

Exercice 19. La fonction de Liouville $\lambda \in C'$ est une fonction strictement multiplicative définie par $\lambda(p) = -1$ pour tout p premiers.

- a. Calculer $\sum_{d|n} \lambda(d)$.

b. Exprimer $L(s, \lambda)$ en termes de la fonction zêta et comme un produit infini.

Exercice 20. Soit $k \in \mathbb{N}$ un nombre naturel et soit $\sigma_k(n)$ la somme de k -èmes puissances de diviseurs de n

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k.$$

Exprimer la série de Dirichlet $L(s, \sigma_k)$ en termes de la fonction zêta.

Exercice 21.

a. Exprimer la somme

$$\sum_{\substack{m,n \in \mathbb{N}^2 \\ (m,n)=1}} \frac{1}{m^2 n^2}$$

en termes de la fonction zêta.

b. La même question pour la somme

$$\sum_{\substack{m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}^k \\ (m_1, \dots, m_k)=1}}^{\infty} \frac{1}{m_1^{s_1} \cdots m_k^{s_r}}$$

Exercice 22.

Soit $J_k(n)$ est le nombre de k -tuplets d'entiers positifs n_1, \dots, n_k inférieurs à n tels que $(n_1, \dots, n_k, n) = 1$.

- a. Exprimer $J_k(n)$ en termes de diviseurs premiers de n .
- b. Calculer $\sum_{d|n} J_k(d)$.
- c. Calculer la série de Dirichlet $L(s, J_k)$.

Exercice 23. La fonction Λ de von Mangoldt est définie par

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \ln p & \text{si } n = p^a \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que pour une fonction f strictement multiplicative

$$\frac{L(s, f)'}{L(s, f)} = -L(s, \Lambda f).$$

Exercice 24. Formule de Perron. Calculer les intégrales

$$a. \quad \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} L(s, f) x^s \frac{ds}{s},$$

$$b^* \quad \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} x^s \frac{ds}{s}.$$

pour $x \in \mathbb{R}_{>0}$ et c assez grand afin que l'intégrale converge.

Exercice 25* Les nombres de Bernoulli B_k sont défini par le développement

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} z^k$$

- a. Calculer B_0, B_1, B_2, B_4 et B_k pour $k > 1$ impaires.
 b. Trouver le développement en série de Taylor de la fonction.

$$f(z) = \pi z \cot \pi z.$$

- c. Exprimer $\zeta(2k)$, $k = 1, 2, \dots$ en termes de nombres de Bernoulli.
 d* Utilisant l'équation fonctionnelle $\zeta^*(s) = \zeta^*(1-s)$ où

$$\zeta^*(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \zeta(s) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi t^2} |t|^{s-1} dt$$

exprimer $\zeta(-k)$, $k = 1, 2, \dots$ en termes de nombres de Bernoulli. En particulier calculer $\zeta(-1)$.

- e. Exprimer $S_m(n) = \sum_{i=0}^n i^m$ en termes de nombres de Bernoulli. *Indication* : Utiliser la formule d'Euler-Maclaurin :

$$\frac{1}{e^{\frac{\partial}{\partial x}} - 1} f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} f^{(k-1)}(x),$$

où $f^{(-1)}(x) := \int_0^x f(t) dt$.

Exercice 26.

- a. Trouver le domaine de divergence simple de la série

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$$

- b. Exprimer $\eta(s)$ en termes de la fonction ζ .

- c. Trouver le résidu $\operatorname{Res}_{s=1} \zeta(s) ds$.

Exercice 27* Trouver la série de Taylor pour la série d'Eisenstein

$$E_{2k}(q) = \sum_{m,n \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau)^{2k}},$$

où $q = e^{2\pi i \tau}$.

Exercice 28. Trouver le résidu $\operatorname{Res}_{s=1} L(s, \chi) ds$, où χ est un caractère de Dirichlet

- a. non-trivial
 b. trivial
 modulo N.

Exercice 29. Trouver les limites

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\varphi(N)}{N} \text{ et } \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{\varphi(N)}{N}$$

où φ est l'indicatrice d'Euler.

Exercice 30* Calculer l'intégrale $\int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^2} dx$, où $\{x\}$ est la partie fractionnelle de x . Exprimer le résultat en termes de la constante d'Euler-Mascheroni

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \approx 0.5772$$

Exercice 31* Trouver le produit infini

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^n)^{\mu(n)/n}.$$

Reponses :

2. c : (a,b) ; d : 26.