

Travaux Dirigés de l'UE Probabilités et Statistiques S4

TD 1 Dénombrement

TD 2 Probabilités conditionnelles

TD 3 Variables discrètes

TD 4 Couple de variables aléatoires & convergence

TD 5 Statistique descriptive

# 1 Dénombrement

## Exercice 1

Eugène et Diogène ont l'habitude de se retrouver chaque semaine autour d'un verre et de décider à pile ou face qui règle l'addition. Eugène se lamente d'avoir payé les quatre dernières additions et Diogène, pour faire plaisir à son ami, propose de modifier exceptionnellement la règle : "Eugène, tu vas lancer la pièce cinq fois et tu ne paieras que si on observe une suite d'au moins trois piles consécutifs ou d'au moins trois faces consécutives". Eugène se félicite d'avoir un si bon ami. À tort ou à raison ?

## Exercice 2

On doit asseoir sur un banc de 10 places, 4 Allemands, 3 Français, et 3 Anglais; les gens de même nationalité devant rester groupés. Combien de dispositions sont possibles ?

## Exercice 3

On veut former un comité de 7 personnes, constitué de 2 démocrates, 2 républicains, et 3 indépendants. On a le choix parmi 6 démocrates, 5 républicains, et 4 indépendants. Combien de choix sont possibles ?

## Exercice 4

8 nouveaux professeurs vont être envoyés dans 4 écoles.

1. Combien d'affectations sont possibles ?
2. Qu'en est-il si l'on impose que chaque école recevra 2 professeurs ?

## Exercice 5

Un groupe de 20 personnes, 12 hommes et 8 femmes doit prendre un car pour effectuer une excursion. Par suite de malentendus, il se présente un car ne comportant que 10 places et prendront part à l'excursion 6 hommes et 4 femmes.

1. Combien peut-on former de groupes possibles de 6 hommes et 4 femmes ?
2. En supposant que M. A et Mme B ne peuvent appartenir à la même excursion, combien de groupes possibles peut-on constituer ?

## 2 Probabilités conditionnelles

### Exercice 1

$A$ ,  $B$  et  $C$  étant des événements d'un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ , écrire les événements suivants :

1.  $A$  et  $B$  se produisent ;
2.  $A$ ,  $B$  et  $C$  se produisent ;
3.  $A$  se produit seul ;
4.  $A$  et  $B$  se produisent, mais pas  $C$  ;
5. Au moins l'un des trois événements se produit ;
6. Au moins deux de ces trois événements se produisent ;
7. Aucun de ces événements ne se produit.

### Exercice 2

1. Soit  $A$  un événement d'un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ .  $A$  est-il indépendant de lui-même ?
2. Soient  $A$  et  $A^c$  deux événements contraires d'un espace probabilisé  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ .  $A$  et  $A^c$  sont-ils indépendants ?

### Exercice 3

On lance deux pièces de monnaie et on considère les événements :

A "la première pièce donne face"

B "la deuxième pièce donne pile"

C "les deux pièces donnent le même résultat"

1. Les événements  $A, B, C$  sont-ils indépendants deux à deux ?
2. Les événements  $A, B, C$  sont-ils globalement indépendants ?

### Exercice 4

Un atelier comporte 3 machines indépendantes entre elles  $A, B, C$ . Les probabilités de défaillance sont respectivement  $\mathbb{P}(\text{défaillance de } A) = 0.1$  ;  $\mathbb{P}(\text{défaillance de } B) = 0.2$  ;  $\mathbb{P}(\text{défaillance de } C) = 0.3$ . Quelle est la probabilité d'avoir exactement une machine en panne ?

### Exercice 5

Une urne contient quatre boules rouges, trois boules noires, une boule blanche. On tire en une seule fois trois boules. On admet l'équiprobabilité des tirages.

On veut calculer la probabilité d'avoir :

A "deux boules rouges au moins"

B "deux boules de même couleur au moins"

C "une boule de chaque couleur"

1. Proposer un espace probabilisé fini permettant la description de cette situation.
2. Calculer les probabilités  $\mathbb{P}(A)$ ,  $\mathbb{P}(B)$  et  $\mathbb{P}(C)$ .

## Exercice 6

On suppose que l'on a autant de chance d'avoir une fille ou un garçon à la naissance. Votre voisin de palier vous dit qu'il a deux enfants.

1. Quelle est la probabilité qu'il ait au moins un garçon ?
2. Quelle est la probabilité qu'il ait un garçon, sachant que l'aînée est une fille ?
3. Quelle est la probabilité qu'il ait un garçon, sachant qu'il a au moins une fille ?
4. Vous téléphonez à votre voisin. Une fille décroche le téléphone. Vous savez que dans les familles à un garçon et une fille, la fille décroche le téléphone avec probabilité  $p$ , quelle est la probabilité que votre voisin ait un garçon ?
5. Vous sonnez à la porte de votre voisin. Une fille ouvre la porte. Sachant que l'aîné(e) ouvre la porte avec probabilité  $p$ , et ce indépendamment de la répartition de la famille, quelle est la probabilité que votre voisin ait un garçon ?

## Exercice 7

Les laboratoires pharmaceutiques indiquent pour chaque test sa sensibilité  $\alpha$ , qui est la probabilité que le test soit positif si le sujet est malade, et sa spécificité  $\beta$ , qui est la probabilité que le test soit négatif si le sujet est sain.

1. Sachant que la probabilité d'être malade est de 1 pour 1000 personnes, calculer la probabilité pour que vous soyez un sujet sain alors que votre test est positif, avec  $\alpha = 98\%$  et  $\beta = 97\%$ .
2. Calculer la probabilité d'être malade alors que le test est négatif.

## Exercice 8

Le jeu télévisé "la porte de la fortune" comporte trois portes :  $A$ ,  $B$  et  $C$ . Derrière l'une d'entre elles se trouve un cadeau et rien derrière les deux autres. Vous choisissez au hasard une des trois portes sans l'ouvrir, par exemple la porte  $A$ . À ce moment-là, le présentateur, qui sait derrière quelle porte se trouve le cadeau, ouvre une porte parmi les deux  $B$  et  $C$ , derrière laquelle il n'y a évidemment rien. On vous propose alors de changer ou non de porte, le but étant d'ouvrir la porte qui cache le cadeau afin de gagner. L'objectif de cet exercice est de déterminer votre meilleure stratégie.

1. On suppose que si le cadeau est derrière la porte  $A$ , alors le présentateur choisit au hasard entre les deux autres portes. Calculer la probabilité pour que le cadeau soit derrière la porte  $B$  sachant que le présentateur ouvre la porte  $C$ . Que faites-vous ?
2. On suppose que si le cadeau est derrière la porte  $A$ , alors le présentateur choisit systématiquement la porte  $B$ . Que faites-vous si le présentateur ouvre la porte  $B$  ?, la porte  $C$  ?
3. Montrer que quelle que soit la valeur de la probabilité pour que le présentateur ouvre la porte  $B$  (respectivement  $C$ ) sachant que le cadeau est en  $A$ , vous avez intérêt à changer de porte. En déduire que la meilleure stratégie consiste à changer systématiquement de porte.

## Exercice 9

Soient  $X$  et  $Y$  deux individus dont les durées de vie sont indépendantes et sont telles que

$$\mathbb{P}(X \text{ vive encore 9 ans}) = 2/5, \quad \mathbb{P}(Y \text{ vive encore 9 ans}) = 3/5.$$

Calculer les probabilités que :

1.  $X$  et  $Y$  vivent encore 9 ans ;
2. l'un des 2 au moins vive encore 9 ans
3.  $X$  seulement vive encore 9 ans
4.  $Y$  seulement vive encore 9 ans
5.  $X$  vive encore 9 ans sachant que l'un des 2 au moins vivra encore 9 ans.

### 3 Variables discrètes

#### Exercice 1

Calculer les fonctions génératrices des lois usuelles : Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson. En déduire leur moyenne et leur variance.

#### Exercice 2

Neuf chevaux, quatre blancs et cinq noirs pénètrent un par un sur la piste d'un cirque. Ils sont distincts les uns par rapport aux autres par leur harnachement.

1. Combien existe-t-il de façons de les faire arriver sur la piste ?
2. On appelle  $X$  la variable aléatoire : nombre de chevaux blancs précédant le premier cheval noir. Donner la loi de probabilité de  $X$ .
3. Calculer l'espérance mathématique de  $X$  et sa variance.

#### Exercice 3

On dispose d'une urne  $\mathcal{U}$  contenant  $\frac{1}{3}$  de boules noires et  $\frac{2}{3}$  de boules blanches et d'une cible  $\mathcal{C}$ . On considère alors le jeu suivant : un joueur tire une première fois sur la cible  $\mathcal{C}$  : s'il l'atteint il a gagné la partie ; sinon il tire au hasard une boule dans l'urne  $\mathcal{U}$  : s'il obtient une boule noire, il a perdu la partie, sinon il remet la boule blanche dans l'urne et retire sur la cible. S'il l'atteint il a gagné la partie ; sinon il retire au hasard une boule dans l'urne ; s'il obtient une boule noire, il a perdu la partie ; sinon il remet la boule blanche dans l'urne et retire sur la cible et ainsi de suite... Soit  $p \in [0, 1]$  la probabilité qu'a le joueur d'atteindre la cible lors d'un tir. On note  $A_n, B_n, A, B, C$  les événements suivants ( $n \in \mathbb{N}^*$ )

$A_n$  "le joueur gagne la partie à l'issue du  $n$ -ème tir"

$B_n$  "le joueur perd la partie à l'issue du  $n$ -ème tir"

$A$  "le joueur gagne la partie"

$B$  "le joueur perd la partie"

$C$  "la partie ne s'arrête pas"

1. Calculer, en fonction de  $n$  et  $p$  les probabilités de  $A_n$  et  $B_n$ .
2. Calculer, en fonction de  $p$  les probabilités de  $A, B$  et  $C$ .
3. Soit  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de coups nécessaires pour arrêter la partie.
  - (a) Déterminer la loi de  $X$ .
  - (b) Calculer  $\mathbb{E}[X]$ ,  $\text{Var}(X)$  et  $\sigma(X)$ .
4. Sachant que le joueur a perdu la partie, calculer la probabilité que ce soit à l'issue du  $n$ -ème tir ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) (on supposera dans cette question  $p \neq 1$ ).
5. Étudier en fonction des valeurs de  $p$ , le fait que le joueur ait plus ou moins de chance de gagner à ce jeu.

#### Exercice 4

Sachant que le nombre moyen de communications téléphoniques reçues par un standard entre 10 h et 11 h est de 1.8 par minute, et que le nombre  $X$  d'appels reçus par minute est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson ; calculer la probabilité pour qu'entre 10h53 et 10h54 il y

ait :

1. aucun appel
2. un appel
3. deux appels
4. au moins deux appels
5. strictement plus de deux appels
6. deux, trois ou quatre appels.

### Exercice 5

Soit  $X$  une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre  $\theta > 0$  (i.e.  $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\theta} \frac{\theta^k}{k!}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ).

1. Vérifier que  $\frac{1}{1+X}$  est une variable intégrable. Calculer  $\mathbb{E} \left[ \frac{1}{1+X} \right]$ .
2. Calculer  $\mathbb{E} \left[ \frac{1}{(1+X)(2+X)} \right]$  et en déduire  $\mathbb{E} \left[ \frac{1}{2+X} \right]$ .

### Exercice 6

On pose 20 questions à un candidat. Pour chaque question  $k$  réponses sont proposées dont une seule est la bonne. Le candidat choisit au hasard une des réponses proposées.

1. On lui attribue un point par bonne réponse. Soit  $X$  le nombre de points obtenus. Quelle est la loi de  $X$  ?
2. Lorsque le candidat donne une mauvaise réponse, il peut choisir à nouveau une des autres réponses proposées. On lui attribue alors  $\frac{1}{2}$  point par bonne réponse. Soit  $Y$  le nombre de  $\frac{1}{2}$  points obtenus lors de ces seconds choix. Quelle est la loi de  $Y$  ?
3. Quelle est la loi de  $X + Y$  ? Les variables  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?
4. Soit  $S$  le nombre total de points obtenus. Déterminer  $k$  pour que le candidat obtienne en moyenne une note de 5 sur 20.

### Exercice 7

Une urne contient  $N$  boules numérotées de 1 à  $N$ . On tire  $n$  boules une à une avec remise. Soit  $X$  et  $Y$  le plus petit et le plus grand des nombres obtenus.

1. Calculer  $\mathbb{P}(X \geq x)$  pour  $x \in \{1, \dots, N\}$ . En déduire la loi de  $X$ .
2. Donner la loi de  $Y$ .
3. Calculer  $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y)$  pour tout  $(x, y) \in \{0, \dots, N\}^2$ .

### Exercice 8

Une variable aléatoire  $X$  prend les valeurs  $k \in \{1, 2, 3, 6\}$ , avec probabilité proportionnelle à  $k$ . Préciser la loi de  $X$ , son espérance, sa variance, et le coefficient de corrélation linéaire entre  $X$  et  $(X - 3)^2$ .

### Exercice 9

Soient  $X$  et  $Y$  deux variable aléatoires indépendantes de loi binomiale de paramètres respectifs  $(n_1, p_1)$  et  $(n_2, p_2)$  avec  $n_1, n_2 \geq 1$  et  $p_1 p_2 > 0$ . À quelle condition  $X + Y$  est-elle de loi binomiale ?

## Exercice 10

Soient  $X_1$  de loi Poisson de paramètre  $\lambda_1 > 0$  et  $X_2$  de loi Poisson de paramètre  $\lambda_2 > 0$ . Ces deux variables sont supposées indépendantes entre elles.

1. Déterminer la loi de  $X_1 + X_2$ .
2. Calculer la loi de  $X_1$  sachant  $X_1 + X_2$ .

## Exercice 11

On modélise le temps qu'il fait à Strasbourg de la façon suivante : s'il fait beau le  $n$ -ième jour, alors la probabilité qu'il fasse beau le  $(n + 1)$ -ième jour est  $1/2$  ; s'il pleut le  $n$ -ième jour, alors la probabilité qu'il fasse beau le  $(n + 1)$ -ième jour est  $1/4$ . On démarre au jour 0, où il pleut.

1. Calculer la probabilité qu'il pleuve le jour 2.
2. Sachant qu'il pleut le jour 2, calculer la probabilité qu'il ait plu le jour 1.
3. On note  $p_n$  la probabilité qu'il pleuve le jour  $n$ . Trouver une relation de récurrence entre  $p_{n+1}$  et  $p_n$ , et déterminer la valeur de  $p_n$ . La suite  $p_n$  converge-t-elle ?

## Exercice 12

On dit qu'une variable aléatoire  $X$  suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$  et on note  $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ , si  $X$  est à valeurs dans  $\mathbb{N}$  et pour tout  $k \in \mathbb{N}$  :

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

1. Soient  $X_1, \dots, X_n$   $n$  variables aléatoires indépendantes de lois respectives  $\mathcal{P}(\lambda_1), \dots, \mathcal{P}(\lambda_n)$ . Déterminer la loi de  $\sum_{i=1}^n X_i$ .
2. Soit  $(X_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires de lois binomiales  $\mathcal{B}(n, p_n)$  où la suite  $p_n$  vérifie  $n \times p_n \rightarrow \lambda > 0$  (on remarquera que cette condition implique que  $p_n \rightarrow 0$ ). Montrer que la suite  $X_n$  converge en loi vers une loi de Poisson  $\mathcal{P}(\lambda)$ .



## 4 Couples de variables aléatoires et convergence

### Exercice 1

Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans  $\{1, 2, \dots, n\}$  telles que

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = A C_{n-1}^{i-1} C_{n-1}^{j-1}, \quad \forall (i, j) \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (1)$$

où  $A$  est une constante.

1. Trouver la constante  $A$  pour que (1) définisse une loi de probabilité.
2. Déterminer la loi marginale de  $X$  et celle de  $Y$ .
3. Les variables  $X$  et  $Y$  sont-elles indépendantes ?
4. Calculer la loi conditionnelle de  $X$  sachant  $\{Y = j\}$ .
5. Calculer  $\mathbb{E}[X]$  et  $\text{Var}(X)$ .

### Exercice 2

On lance  $n$  fois une pièce. On désigne par  $p \in ]0, 1[$  la probabilité d'avoir pile. Soit  $X$  le nombre de piles obtenu après ces  $n$  lancers et  $Y$  celui de face. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de  $X$  et  $Y$ .

### Exercice 3

Un étudiant s'ennuie en cours et passe son temps à regarder par la fenêtre les feuilles tomber d'un arbre. On admet que le nombre de feuilles tombées à la fin du cours est une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda > 0$ .

1. Donner  $\mathbb{P}(X = k)$  et les valeurs possibles pour  $k$ .
2. Pour  $\lambda > 0$ , donner la valeur de

$$e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

3. Calculer l'espérance et la variance de  $X$ .  
À chaque fois qu'une feuille tombe par terre, l'étudiant lance une pièce qui donne pile avec une probabilité  $p$  et face avec une probabilité  $q = 1 - p, p \in (0, 1)$ . On note  $F$  et  $P$  le nombre de faces et de piles obtenus respectivement.
4. Pour  $k \in \mathbb{N}$  fixé, expliquer de manière simple pourquoi la loi de  $F$  sachant  $X = k$  est une loi binomiale dont on précisera les paramètres. En déduire l'expression de  $\mathbb{P}(F = a | X = k)$ .  
On donnera les valeurs possibles pour  $a$ .
5. Pour  $k \in \mathbb{N}$  et  $a \in \mathbb{N}$ , calculer la quantité  $\mathbb{P}(\{X = k\} \cap \{F = a\})$ .
6. Montrer que  $\mathbb{P}(F = a) = e^{-\lambda q} \frac{(\lambda q)^a}{a!}$ . Identifier la loi de  $F$ .
7. Donner, sans calculs, la loi de  $P$ .
8. Montrer que  $P$  et  $F$  sont indépendantes.
9. Calculer l'espérance de  $PF$  et la variance de  $P + F$ .

### Exercice 4

Soient  $X_1, \dots, X_n, \dots$  des variables aléatoires, indépendantes et de même loi de Poisson de paramètre 1.

1. Que vaut  $\mathbb{P}(X_1 = k)$  et quelles sont les valeurs possibles prises par la variable aléatoire  $X_1$ .
2. Calculer la fonction génératrice de  $\sum_{i=1}^n X_i$  et identifier la loi de  $\sum_{i=1}^n X_i$ .
3. Donner la définition de la convergence en probabilité.
4. Est-ce que  $\sum_{i=1}^n X_i/n$  converge en probabilité? Si oui vers quoi?
5. Démontrer le résultat de la question 4. en utilisant une inégalité du cours.
6. Énoncer le théorème central limite.
7. En utilisant le théorème central limite donner la limite de  $\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n X_i \leq n)$  quand  $n \rightarrow \infty$ .
8. En déduire la valeur de

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

## 5 Statistique descriptive

### Exercice 1

Paul a noté pendant 12 jours la température en degré Celsius, au lever du jour :

$-3; -4; 0; 1; 5; 5; 2; -1; -5; 2; 6; 7.$

1. Calculer la moyenne de cette série.
2. Ranger cette série dans l'ordre croissant.
3. Déterminer la médiane de cette série.
4. Déterminer les premier, deuxième et troisième quartiles de cette série.
5. Calculer l'étendue de cette série.

### Exercice 2

1. On considère la série suivante :

5; 10; 5; 8; 4; 11; 6; 4; 8; 7; 9; 6; 13; 15; 8; 7; 5; 10

- (a) Quel est l'effectif total de cette série ?
  - (b) Quelle est la médiane de cette série ?
  - (c) Quel est le 1er quartile de cette série ?
  - (d) Quel est l'écart interquartile de cette série ?
2. On considère la série suivante :

valeurs	22	23	24	25	26	27
fréquences cumulées	0.15	0.24	0.37	0.53	0.79	1

- (a) Quel est le pourcentage de la valeur 25 ?
- (b) Quelle est la médiane de cette série ?
- (c) Quel est le 1er quartile de cette série ?

### Exercice 3

Suite aux mauvais résultats obtenus par les étudiants à un examen, un professeur envisage d'augmenter toutes les notes des étudiants présents à l'examen de 10%. En d'autres termes, si un étudiant  $x$  a obtenu la note de  $x$ , celle-ci sera transformée en  $y = x + 10\%x = x + x/10 = 11/10x$ . Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Un justificatif précis (une ligne suffit pour chaque item) est demandé :

1. La moyenne empirique des résultats ne sera pas modifiée et leur écart-type empirique non plus.
2. La moyenne empirique des résultats sera multipliée par 10 et leur écart-type empirique restera inchangé.
3. La moyenne empirique des résultats augmentera de 10% et leur écart-type empirique restera inchangé.
4. La moyenne empirique des résultats et leur variance empirique augmenteront de 10%.
5. La moyenne empirique des résultats augmentera de 10% et leur variance empirique augmentera de 21%.

6. La moyenne empirique des résultats et leur variance empirique seront multipliées par 10.
7. La moyenne empirique des résultats augmentera de 10% et leur médiane restera inchangée.
8. La médiane et la variance empirique des résultats augmenteront de 10%.
9. L'écart interquartile et la variance empirique des résultats augmenteront de 21%.

## Exercice 4

Voici différentes questions à choix unique (une seule réponse possible !). Justifier votre réponse en une ligne.

1. On dispose d'un échantillon de taille  $n$  noté  $x_1, \dots, x_n$ . On ajoute une donnée à ce nouvel échantillon, qui contient donc maintenant  $n + 1$  données. Supposons que cette donnée est la médiane de l'échantillon initial  $x_1, \dots, x_n$ . Quelle conséquence cela a sur la moyenne empirique de l'échantillon de taille  $n + 1$  ?
  - (a) La moyenne empirique augmente
  - (b) La moyenne empirique diminue
  - (c) La moyenne empirique ne change pas
  - (d) Aucune des réponses précédentes.
2. Plus la moyenne empirique de l'échantillon  $x_1, \dots, x_n$  est élevée et plus sa variance empirique est élevée.
  - (a) Vrai.
  - (b) Faux.
3. Soit un groupe de 10 sujets passant un test, noté sur 100, mais pouvant donner lieu à une note positive comme négative. La moyenne empirique obtenue au test par les 10 sujets est égale à 75. Si nous enlevons 75 points à chacun des sujets, la variance empirique
  - (a) augmente.
  - (b) diminue.
  - (c) ne change pas.
  - (d) devient égale à 0.
4. Soient  $x_1, \dots, x_n$ ,  $n$  distances mesurées en centimètres. Notons  $\bar{x}_n$  la moyenne empirique de cet échantillon. Le fait de retraduire les mesures en mètres nous fournit une nouvelle série  $y_1, \dots, y_n$ , de moyenne empirique  $\bar{y}_n$ . Les moyennes empiriques  $\bar{x}_n$  et  $\bar{y}_n$  sont liées entre elles par la relation suivante
  - (a)  $y_n = x_n$ .
  - (b)  $\bar{y}_n = 100\bar{x}_n$ .
  - (c)  $\bar{y}_n = \bar{x}_n/100$ .
  - (d)  $\bar{y}_n = \bar{x}_n - 100$ .
  - (e)  $\bar{y}_n = \bar{x}_n/10000$ .
5. On se place dans le même contexte que dans 4) mais cette fois-ci on s'intéresse à la variance empirique. Les variances empiriques  $s_x^2$  et  $s_y^2$  sont liées entre elles par la relation suivante
  - (a)  $s_y^2 = 100s_x^2$ .
  - (b)  $s_y^2 = 10000s_x^2$ .
  - (c)  $s_y^2 = s_x^2/100$ .
  - (d)  $s_y^2 = s_x^2/1000$ .
  - (e)  $s_y^2 = s_x^2/10000$ .