

2024-2025

Topologie, feuille 3

Exercice 1. Soient (X, \mathcal{T}_X) et (Y, \mathcal{T}_Y) deux espaces topologiques et soit \mathcal{B} une base pour \mathcal{T}_Y . Montrer que $f : (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ est continue si et seulement si pour tout $U \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Exercice 2. Soient (X, \mathcal{T}_X) et (Y, \mathcal{T}_Y) deux espaces topologiques et soit $f : (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ une application continue et injective. Montrer que si (Y, \mathcal{T}_Y) est séparé, alors (X, \mathcal{T}_X) est séparé.

Exercice 3. Soient (X, \mathcal{T}_X) et (Y, \mathcal{T}_Y) deux espaces topologiques. Montrer que $f : (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ est continue si et seulement si pour tout sous-ensemble A de X , $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Exercice 4. Soit (X, \mathcal{T}) un espace topologique. On suppose que toutes les applications de X dans \mathbb{R} (muni de la topologie euclidienne) sont continues. Montrer que \mathcal{T} est la topologie discrète.

Exercice 5. Soient \mathcal{T}_1 et \mathcal{T}_2 deux topologies sur un ensemble X , et soit Y un sous-ensemble de X . On suppose que \mathcal{T}_2 est plus fine que \mathcal{T}_1 . Que dire des topologies induites par \mathcal{T}_1 et \mathcal{T}_2 sur Y ?

Exercice 6. Soit (E, d) un espace métrique et soit A une partie non vide de E . Pour tout x dans E on appelle *distance de x à A* , notée $d(x, A)$, le nombre $\inf_{y \in A} d(x, y)$.

1. Montrer que l'application de E dans \mathbb{R} qui à x associe $d(x, A)$ est bien définie et s'annule sur A .
2. On note B l'ensemble des points $x \in E$ tels que $d(x, A) = 0$. Montrer que B est égal à l'adhérence de A .

Exercice 7. Soit A le sous-ensemble de \mathbb{R} défini par $A = [0, 5[$. On munit A de la topologie induite par la topologie euclidienne sur \mathbb{R} .

1. Pour chacune des trois parties suivantes de A , justifier si elles sont ouvertes et si elles sont fermées.
 - (a) $]1, 2]$.
 - (b) $[3, 5[$.
 - (c) $[0, 3[$.
2. Donner les intérieurs et les adhérences de ces parties dans A .
3. Déterminer la boule ouverte de centre 1 et de rayon 2 dans A .

Exercice 8. Donner des exemples d'espaces topologiques pour lesquels il existe des parties :

1. à la fois ouvertes et fermées,
2. ni ouvertes ni fermées.

Exercice 9. Dans \mathbb{R}^2 muni de la métrique euclidienne usuelle on considère le sous-ensemble

$$\Theta = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-1, 1]\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, x \neq 0\}.$$

Dessiner cette partie Θ de \mathbb{R}^2 . Est-elle ouverte, fermée dans \mathbb{R}^2 ? Déterminer son intérieur et son adhérence.

Exercice 10. Soit A une partie d'un espace topologique X .

1. Montrer que $X \setminus (\overline{X \setminus A}) = \overset{\circ}{A}$.
2. Montrer que $X \setminus (X \setminus \overset{\circ}{A}) = \overline{A}$.

Exercice 11. On munit \mathbb{R} de la topologie euclidienne. Déterminer l'adhérence et l'intérieur de chacun des sous-ensembles ci-dessous.

1. $]0, 1[$,
2. $[0, 1]$,
3. $]0, 1]$,
4. $]1, +\infty[$,
5. $] - \infty, 1]$,
6. \mathbb{R} ,
7. \emptyset ,
8. $\{0\}$,
9. \mathbb{Z} ,
10. \mathbb{Q} .

Exercice 12. Soit X un espace topologique et soit A une partie de X . On appelle *frontière* de A l'ensemble $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.

1. Montrer que $\partial \overline{A} \subset \partial A$ et $\partial \overset{\circ}{A} \subset \partial A$. Donner des exemples sur \mathbb{R} où les inclusions sont strictes.
2. Montrer que $\partial(X \setminus A) = \partial A$.
3. Montrer que les parties $(X \setminus \overset{\circ}{A})$, ∂A et $\overset{\circ}{A}$ sont disjointes, et que $X = (X \setminus \overset{\circ}{A}) \cup \partial A \cup \overset{\circ}{A}$.

Exercice 13. Soit X un espace topologique et soient A et B des parties de X .

1. On suppose que $A \cup B = X$. Montrer que $\overline{A} \cup \overset{\circ}{B} = X$.
2. On suppose que $A \cap B = \emptyset$. Montrer que $\overline{A} \cap \overset{\circ}{B} = \emptyset$.

Exercice 14. Soit X un espace topologique et soient A et B deux sous-ensembles de X . On suppose que $A \cap B = \emptyset$ et que A et B sont denses dans E . Montrer que l'on a $\overset{\circ}{A} = \overset{\circ}{B} = \emptyset$.

Exercice 15. Soit E un espace vectoriel normé et soit F un sous-espace vectoriel de E . Montrer que si $\overset{\circ}{F} \neq \emptyset$, alors $F = E$.