

2025-2026

Topologie, feuille 5 : Espaces compacts

(Rappel : Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'un espace métrique (X, d) admet une valeur d'adhérence a s'il existe une sous-suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers a .)

Exercice 1. Soit X un ensemble infini muni de la métrique discrète d définie par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$.

1. Montrer que toute partie de X est bornée et fermée.
2. Montrer qu'un sous-ensemble de X est compact si et seulement s'il est fini.

Exercice 2.

1. Le sous-espace métrique $\mathbb{N}$ de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est-il compact ?
2. Un espace métrique muni de la distance discrète est-il compact ?

Exercice 3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et soient K et L deux parties compactes de E . Montrer que l'espace somme $K + L$ est une partie compacte de $(E, \|\cdot\|)$.

Exercice 4. Soient deux espaces topologiques compacts X et Y . Montrer que $X \times Y$ est un espace topologique compact.

Exercice 5. Soit X un espace topologique et soient $K_1, \dots, K_n$ des parties compactes de X . Montrer que la réunion $K = \bigcup_{i=1}^n K_i$ est un compact de X et que si X est de plus séparé, l'intersection $K' = \bigcap_{i=1}^n K_i$ est un compact de X .

Exercice 6. Soit A un sous-ensemble de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$. On appelle *point d'accumulation* de A tout point a de $\mathbb{R}$ tel que

$$\forall \varepsilon > 0 \quad (]a - \varepsilon, a[\cup]a, a + \varepsilon[) \cap A \neq \emptyset.$$

1. Montrer que x_0 est un point d'accumulation de A si et seulement s'il existe une suite non stationnaire de A qui converge vers x_0 .
2. Montrer que toute partie infinie bornée de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ admet au moins un point d'accumulation.

Exercice 7. Soient (X, d) un espace métrique compact et $f : X \rightarrow X$ une application telle que pour tous x et y de X ,

$$\text{si } x \neq y, \text{ alors } d(f(x), f(y)) < d(x, y).$$

Montrer que f admet un unique point fixe.

Donner des exemples qui montrent que le résultat n'est pas vrai si :

1. on ne suppose plus X compact ;
2. on suppose seulement $d(f(x), f(y)) \leq d(x, y)$.

Exercice 8. Soit X un espace topologique séparé et localement compact (c'est-à-dire que chaque point de X admet un voisinage compact). Posons $X_w := X \cup \{w\}$ où $w \notin X$. Notons $\mathcal{T}_w$ l'ensemble des parties de X_w qui sont soit des ouverts de X , soit de la forme $\{w\} \cup (X \setminus K)$ avec K compact.

1. Montrer que $\mathcal{T}_w$ est une topologie de X_w .
2. Montrer que X_w muni de cette topologie est compact et séparé.
3. Montrer que l'inclusion $X \subset X_w$ définit une injection continue de X dans X_w .
4. Montrer que $\mathbb{R}_w^2$ est homéomorphe à S^2 , la sphère de dimension 2.

Cette construction s'appelle la *compactification d'Alexandrov* de X .

Exercice 9. Pour $n \geq 1$, soit $M_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles de taille $n \times n$. Montrer que $O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t A = I\}$ est compact. (Indication : Montrer que $(A, B) \mapsto \text{Tr}(A^t B)$ est un produit scalaire sur $M_n(\mathbb{R})$.)

Exercice 10. Soit $(X = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), d_\infty)$ l'espace des fonctions continues muni de la distance

$$d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|.$$

On veut montrer que la boule unité fermée $B \subset X$ n'est pas compacte.

1. Expliquer par un dessin l'allure des fonctions contenues dans la boule B .
2. Dessiner, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une fonction continue $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, qui s'annule en dehors de l'intervalle $[\frac{1}{2n+1}, \frac{1}{2n}]$ et qui prend la valeur 1 au milieu de l'intervalle.
3. Pour tous n, m entiers, que vaut $d_\infty(f_n, f_m)$?
4. Conclure.

Exercice 11. Soit (X, d) un espace métrique compact et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de X admettant une unique valeur d'adhérence. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice 12. Soit (X, d) un espace métrique non-vidé compact. On note $\text{diam}(X) = \sup_{x, y \in X} d(x, y) \in [0, +\infty]$.

1. Montrer que $\text{diam}(X)$ est fini et qu'il existe $x, y \in X$ tels que $\text{diam}(X) = d(x, y)$.
2. Montrer que, si $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de fermés non-vides de X , alors $F := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un compact non-vidé de X et $\text{diam}(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n)$.
3. Si on ne suppose plus (X, d) compact, cette intersection est-elle nécessairement non-vidé ?

Exercice 13. Soit $(X, \mathcal{T})$ un espace topologique. On dit qu'une famille $(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$ de parties de $\mathcal{T}$ possède la propriété d'intersection finie si pour tout sous-ensemble fini $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$, l'intersection $\bigcap_{j \in \mathcal{J}} A_j$ est non-vidé.

Montrer que X est compact si et seulement si pour toute famille $(F_i)_{i \in \mathcal{I}}$ de fermés possédant la propriété d'intersection finie, l'intersection $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} F_i$ est non-vidé.

Exercice 14. Soient $(X, \mathcal{T}_X)$ et $(Y, \mathcal{T}_Y)$ deux espaces topologiques. On suppose que $(X, \mathcal{T}_X)$ est compact et $(Y, \mathcal{T}_Y)$ est séparé. Soit $f : X \rightarrow Y$ continue ; montrer que f est fermée (l'image par f de tout fermé est fermé).

Exercice 15. Soient $(X, \mathcal{T}_X)$ et $(Y, \mathcal{T}_Y)$ deux espaces topologiques. On suppose que $(Y, \mathcal{T}_Y)$ est compact. Montrer que la projection $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ est fermée.